

Geänderte Blutdruckbehandlung im Spital

k -- Anderson TS, Wray CM, Jing B et al. Intensification of older adults' outpatient blood pressure treatment at hospital discharge: national retrospective cohort study. BMJ. 2018 Sep 12;362:k3503.

[\[LINK\]](#)

Zusammenfassung: Renato L. Galeazzi

Warum diese Studie?

Mehr als die Hälfte der hospitalisierten Erwachsenen wird mit einer veränderten ambulanten Arzneimittelbehandlung aus dem Spital entlassen. In der vorliegenden Studie wurde die Häufigkeit und die Berechtigung von Anpassungen der Blutdruckbehandlung im Krankenhaus untersucht. Eingeschlossen wurden 14'915 Personen über 65 Jahre (97% Männer, medianes Alter 76 Jahre), die wegen Pneumonie, Urininfekt oder thromboembolischer Erkrankung im «Veterans Affairs Health System» hospitalisiert wurden und schon vor dem Spitalaufenthalt eine Hypertonie hatten.

Was hat man gefunden?

Bei 65% dieser Kranken war vor der Hospitalisation der Blutdruck gut eingestellt. Im Spital wurden dann bei 24% erhöhte bis stark erhöhte Blutdruckwerte gefunden