

Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfraction: Sacubitril-Valsartan nicht wirksamer als Valsartan

r -- Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS et al. Angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2019 Oct 24;381:1609-20

[\[LINK\]](#)

Zusammenfassung: Natalie Marty

Der Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor Sacubitril-Valsartan (Entresto®) war in einer früheren Studie bei Personen mit Herzinsuffizienz und reduzierter linksventrikulärer Auswurfraction dem ACE-Hemmer Enalapril (Reniten® u.a.) bezüglich Überleben und Rehospitalisationen überlegen. Bei Personen mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurfraction hat bisher keine Therapieform Morbidität oder Mortalität nachweislich gesenkt. In der vorliegenden randomisierten Studie wurde bei 4822 Personen mit Herzinsuffizienz der Klassen NYHA II-IV und einer Auswurfraction $\geq 45\%$ Sacubitril-Valsartan mit Valsartan (Diovan® u.a.) verglichen. Die Behandlung mit Sacubitril-Valsartan führte nicht zu einer signifikant kleineren Rate von Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz oder Tod durch kardiovaskuläre Ursachen.

Telegramm von Natalie Marty