

## Risiken von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (Studie 2)

**m** -- Gunnell D, Saperia J, Ashby D. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and suicide in adults: meta-analysis of drug company data from placebo controlled, randomised controlled trials submitted to the MHRA's safety review. BMJ 2005 (19. Febr

[\[LINK\]](#)

---

Zusammenfassung: Marcel Zwahlen

Kommentar: Konrad Michel

Eine zweite systematische Übersichtsarbeit zum Suizidrisiko bei der Behandlung mit SSRI stützt sich auf die Angaben, die der britischen Arzneimittelbehörde zur Verfügung standen. Die Studie, in welche Daten von über 40'000 Behandelten einfließen, konnte eine Risikoerhöhung nicht präzise abschätzen. Eine substantielle Risikoerhöhung konnte aber auch nicht ausgeschlossen werden. Für eine Einschätzung der Risiken von SSRI müssten weitere grosse Studien mit längerer Beobachtungsdauer durchgeführt werden. Die Studienverantwortlichen empfehlen, Depressive unter einer Therapie mit SSRI zu Beginn der Therapie eng zu überwachen und sie über das potentielle Risiko zu informieren. Beide Studien

zusammengefasst von Marcel Zwahlen